

よくある質問 (FAQ)

医療用医薬品に関するよくある質問

【製品名】 ランソプラゾール OD 錠 15mg/30mg 「DK」

Q

何味ですか。

A

ココア味です。

【製品名】 シルденаフィル錠 VI 25mg/50mg 「DK」

Q

シルденаフィル錠を購入したい。

A

個人のお客様：

医療用医薬品になりますので、個人のお客様への販売はしていません。

医療関係者様：

[【お問い合わせ】](#) までご連絡ください。

【製品名】 タダラフィル錠 VI 10mg/20mgCI 「あすか」

Q

タダラフィル錠を購入したい。

A

個人のお客様：

医療用医薬品になりますので、個人のお客様への販売はしていません。

医療関係者様：

[【お問い合わせ】](#) までご連絡ください。

製品のお取り扱いについて

Q

医療用医薬品及び一般用医薬品の取扱いを行いたい。

A

弊社では販売提携先企業に委託しております。

お取扱い等につきましては、販売提携先企業にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

[【販売会社一覧リスト】](#) 参照

Q

ミノキシジル製剤の取扱いを行いたい。

A

ミノキシジル製剤のお取扱い等につきましては、[【お問い合わせ】](#)までご連絡ください。

ミノキシジル製剤に関するよくある質問

【効能効果について】


Q

どのような人に効果があるか。

A

成人男性（20歳以上）で、壮年性脱毛症の方に効果があります。頭頂部の脱毛あるいは薄毛の方に適しております。

なお、製品外箱の側面に対象となる代表的な脱毛あるいは薄毛パターンをイラストで例示しておりますので、ご参照ください。



注 注

Q

注) 脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得られない可能性があります。

Q

壮年性脱毛症とはどのような脱毛症か。

A

壮年性脱毛症では、成長期～退行期～休止期という毛髪の生え変わる周期（ヘアサイクル）を繰り返す過程で成長期が短くなり、休止期にとどまる髪が多くなります。

Q

どのくらいで効果があらわれるか。

A

ミノキシジルローション5%製剤の有効性は、4ヵ月使用後から認められております。効果がわかるようになるまで少なくとも4ヵ月間、毎日ご使用ください。なお、毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。

6ヵ月間使用して、脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。

Q

効果があらわれたか、どこでわかるか。

A

脱毛状態の程度の改善、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度の改善（太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も含む）が認められるようになります。

Q

使用する前に注意することはあるか。

A

（セルフチェックシートや使用上の注意記載事項を基に回答。以下のお客様には、必要に応じて医師に相談するよう伝える。）

■今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。

■高血圧の人、低血圧の人。

■心臓又は腎臓に障害のある人。

■むくみのある人。

■家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。

■高齢者（65歳以上）。

■甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）の診断を受けている人。

Q

ミノキシジルの使用をやめたらどうなりますか。

A

効果を維持するには継続して使用していただく必要があります。使用を中止してしまうと、徐々に毛髪が抜け落ち元の状態に戻ります。

【安全性について】

Q

最も頻繁に生じる副作用は何か。

A

塗布した部分に生じるかゆみと炎症です。このような症状が現れた場合には、ご使用をおやめください。症状が気になる場合、症状が重い場合や度重なる場合は、医師にご相談ください。

Q

きず、湿疹等がある頭皮に使用してもよいか。

A

きず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある頭皮には使用しないでください。きず等を悪化させることがありますので、その部位が完全に治ってからご使用ください。

Q

においはあるか。

A

無香料ですが、使用直後はわずかにエタノール等のにおいがします。

Q

整髪料を使用してもよいか。

A

本剤を使用した後、乾いてからご使用ください。

Q

染毛剤（ヘアカラー、白髪染め等）を使用してもよいか。

A

完全に染毛を終えた後に本剤をご使用ください。

Q

血圧に影響はあるか。

A

本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。現在治療中である場合は、治療を受けている医師に必ずご相談ください。

Q

使用后どのくらいたてば洗髪してよいか。

A

できるだけ時間をおいてから洗髪してください。なお、本剤を使用する際は、できるだけ清潔な頭皮にご使用ください。

Q

使用を中止するとどうなるか。

A

使用を中止すると毛髪の状態が徐々に元に戻ります。弊社製品は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありませんので、効果を維持するには継続してご使用ください。

【使用方法について】

Q


何回か塗布しているが、薬液が出続けてしまう。使い方はあるのか。

A

「▲ぬる」マークに合っていないと、1 mLを超えて薬液が出続けてしまいます。


STEP. 1

白色の回転部の「△」マークを矢印の方向に回して、「▲はかる」マークにしっかりと合わせてください。




STEP. 2

ゆっくり容器を傾けると、透明な液体がドーム部に流れ込んでいく仕組みとなっています。真下に向けてと完全にドーム部が薬液で満たされます。



STEP. 3

この状態で回転部の「△」マークを「▲ぬる」マークに回転させてください。1回量の1 mLが計量されておりますので、気になる頭皮に塗布してください。



Q

先端の薬液が減らないが、1 mL計量ができているのか。

A

塗布開始後しばらく薬液減少が確認出来なくても、1 mLは計量されています。塗布終盤になると液面の減少が確認出来ます。

また、1回の吐出量は少量のため、塗布回数が多くなります（100回以上になる場合があります）

塗布する動作をゆっくり行うことにより、塗布回数を減らすことができます。