

ミノカミング

壮年性脱毛症における発毛剤

第1類医薬品

説明書

特徴

- 有効成分であるミノキシジルを5%配合した壮年性脱毛症における男性用の発毛剤です。
- 毛包を大きくして毛幹を太くし、毛髪の成長期を刺激することで、発毛を促進します。
- 1回の使用量(1mL)を計量できる容器です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。)

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)女性。
[日本人女性における安全性が確認されていません。]
 - (3)未成年者(20歳未満)。
[国内での使用経験がありません。]
 - (4)壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。
[本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。]
 - (5)脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。
[壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。]
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1)本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。
[血圧が下がる等のおそれがあります。]
 - (2)きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。
[きず等を悪化させることがあります。]
3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、避けてください。又、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。
[これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。]

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (2)高血圧の人、低血圧の人。
[本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。]
 - (3)心臓又は腎臓に障害のある人。
[本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。]
 - (4)むくみのある人。
[むくみを増強させる可能性が考えられます。]
 - (5)家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。
[壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。]
 - (6)高齢者(65歳以上)。
[一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。]
 - (7)次の診断を受けている人。
甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。
[甲状腺疾患による脱毛の可能性ががあります。]

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等
精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい
循環器	胸の痛み、心拍が速くなる
代謝系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ

*頭皮以外にあらわれることもあります。

3. 6ヵ月間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります)。
[壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。]
4. 使用開始後6ヵ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛等。
[壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。]

その他の注意

1. 毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも4ヵ月間、毎日使用してください。
[ミノキシジルローション5%製剤の有効性は4ヵ月使用後から認められています。]
2. 毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。
3. 効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。
[本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。]

— 効能・効果 —

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。



— 用法・用量 —

成人男性(20歳以上)が、1日2回、1回1 mLを脱毛している頭皮に塗布してください。

＜注意＞

- (1)用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがりません。定められた用法・用量を厳守してください(決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります)。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3)薬液のついた手で、目等の粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。
- (4)アルコール等に溶けるおそれのあるもの(メガネわく、化学繊維等)にはつかないようにしてください。
- (5)整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。
- (6)染毛剤(ヘアカラー、毛染め、白髪染め等)を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。

— 成分・分量(100mL中) —

成分	分量	はたらき
ミノキシジル	5g	発毛、育毛及び脱毛の進行を予防します。

添加物：エタノール、1,3-ブチレングリコール、プロピレングリコール、pH調整剤

— 保管及び取扱い上の注意 —

1. 使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所を避け、涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
4. 火気に近づけないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

— ご使用にあたって —

お使いになる方の髪質や1ヵ所への集中塗布等により、ごわつき感が出たり、くし通りが悪くなったり、部分的に白くなる(成分の結晶化)ことがあります。毎日洗髪を行い、頭皮を清潔にして、用法・用量を守ってお使いください。

— 正しい洗髪方法 —

1. ぬるま湯でざっと髪と頭皮の汚れを洗い流します。
2. 洗髪時の髪への摩擦を少なくするため、シャンプーは直接髪につけず、手のひらでよく泡だててお使いください。
3. 爪を立てずに、指の腹で頭皮をマッサージするように洗います。
4. シャンプーをよく洗い流します。すすぎ残りはふけ・かゆみの原因になります。

本製品のお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせ申し上げます。

＜購入についてのお問い合わせ＞

連絡先：株式会社シーディ お客様相談室

電話：0120-19-9989

受付時間：10：00～18：00(土・日・祝日を除く)

＜製品についてのお問い合わせ＞

連絡先：御所薬舗株式会社 お客様相談室

電話：0745-62-3388

受付時間：9：00～17：00(土・日・祝日を除く)

発売元 **株式会社シーディ**
埼玉県草加市谷塚上町575-6

提携 **御所薬舗株式会社**
奈良県御所市1207番地

製造販売元 **大興製薬株式会社**
埼玉県川越市下赤坂560番地1

＜副作用被害救済制度のお問い合わせ先＞

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

2490-CD-70-00